

**4.2.10**  
**מועד א',**  
**הזמן: שלוש שעות**

**ד"ר בני ארואטי**  
**פרופ' אדוארדו מיטרני**  
**פרופ' רחל נחושתאי**  
**ד"ר רחל גריין**

**בחינה בקורס : "מתא לאורגניזם" - (72109)**

**חלק א' – ביולוגיה של התא**  
**ד"ר בניי ארואטי**

- עלייך לענות על **10 מתוך 12** שאלות. כל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נק'.
- חלק זה מהווה 50% מצוון הבחינה
- לכל שאלה תשובה **אחד** נכון ביותר. אני הקיפו לך ורק אותה **ובעט לבד**.

1. מי מהקבוצות הפון-ציונליות הבאות מצויות בכל חומצות האmino?

א. אלדהיד ו-קטון (aldehyde and ketone)

ב. קטון ו-אלכוהול (ketone and alcohol)

ג. קרבוקסיל ו-אמין (carboxyl and amine)

ד. אמין ו-אלדהיד (amine and aldehyde)

2. החוק של Chargaff גורס כי:


א. ב- RNA, כמות הפוריינים (purines) שווה לכמות הפirimידינים (pyrimidines)

ב. ב- DNA, כמות הפirimידינים שווה לכמות הפוריינים

ג. אדנין (adenine) הקשור ל-תימין (thymine) באמצעות שלושה קשרי מימן

ד. הקשר בין אדנין לתימין חזק יותר מאשר הקשר בין ציטוזין (guanine) ל-גואנין (cytosine)

.3



סמן את ההצעה הנכונה הנוגעת לחומר המורכב מה מולקוללה המצוירת.

א. סביר להניח שהחומר יימצא במצב נוזלי ב-  $4^{\circ}\text{C}$

**ב.** החומר מורכב ממולקולות שהן חומצות שומן רוויות

ג. החומר מורכב ממולקולות שהן חומצות שומן בלתי-רוויות

ד. בתשובות א' ו- ב' ההצעות נכונות

4. איזו רמה מבנית של חלבון תושפע הכיו פחות מהרס קשרי מימן?

**א.** מבנה ראשוני

ב. מבנה שניוני

ג. מבנה שלישיוני

ד. מבנה רביעוני

ה. כל המבנים המצוויינים לעיל יפגעו באותה מידת מהרס קשרי מימן

5. באיזו תשובה מצוויים מרכיבים מסוימים ביצוב גدليل של mRNA מיד לאחר הייצור?


**א.** 5'-cap - poly-A-tail

ב. 3'-cap - poly-A-tail

ג. המקטע ב- mRNA המקודד לחלבון

ד. אקסונים (exons) ו-איןטרונים (introns)


.6



למולקולה המצוירת קצה 3' ארוך ובולט מעבר לקצה ה- 5'. איזה תהליך יתרחש בקצה ה- 3'?  
א. רצפי הקודונים הבולטים (3'-A-C-C-A-3') יקשרו רצפי אנטי-קודונים מתאימים

**ב. לקצה הבולט תקשר חומצה אמינית**

ג. הקצה 3' הבולט יתחז על ידי אנזים  
ד. תתי היחidot הקטנות והגדלות של ריבוזומים יקשרו לקצה 3'



בניסוי של Frederick Griffith המוצג באירור, חמידקים אלימים היכולים להמית עכברים (חמידקים מזן S) הומתו באמצעות חיימום בטמפרטורה גבוהה (heat killed). מה התרחש כאשר חמידקים אלו הזרקו לעכברים ביחד עם חמידקים מזן R חיים?

- א. חומר תורשתי, כנראה DNA, שמקורו בחמידקי S חדר לחמידקי R, שהפכו בעקבות כך לחמידקים אלימים ומימיים לעכברים
- ב. חומר תורשתי, כנראה DNA, שמקורו בחמידקי R חדר לחמידקי S, שהפכו בעקבות כך לחמידקי S אלימים ומימיים
- ג. חמידקי S הפרישו חלבוניים במהלך החימום, וחלבוניים אלו גרמו למות העכבר
- ד. בחמידקי S שהוממו ה-RNA תורגם לחלבוניים רעלים שהמיתו את העכבר. התהליך מכונה טרנספורמציה (transformation).

8. כתוצאה מהידROLיזה של ATP משתחררת אנרגיה חופשית וגם פוסfat אינאורגני (inorganic phosphate, Pi). על-סמן החומר שלמדת בקורס, איזה תפקיד ממלא הפוסfat בתאים?

א. הפוסfat משמש לייצור מולקולות ATP וספנות מ-

ב. הפוסfat יכול לחזור לגרעין התא ולהשפי על שעתוק גנים, וביתויים

ג. הפוסfat יכול להקשר בקשר קולנטלי למולקולות אחרות בתא ולהפוך אותן למולקולות פעילות

ד. הפוסfat יכול למלא תפקידים המצוינים בתשובות א' ו- ג'

9. מי מהתהליכים הבאים יצא לפועל כתוצאה מהשקיית אנרגיה המספקת באופן ישיר מהידROLיזה של ATP?

א. מעבר של גלוקוז מחוץ התא לציטופלasmת התא באמצעות נsha

ב. יציאת יוני  $\text{Na}^+$  מציטופלasmת התאים למדיום החוץ-תאי באמצעות משאבת נתרן-אשלגן

ג. כניסה של יוני טעונים חיובית מהמדיום החוץ-תאי לציטופלasmת התא באמצעות עלת יוניים

ד. שני התהליכים המתוארים בתשובות ב' ו-ג' דורשים אנרגיה המשוחררת כתוצאה מהידROLיזה של ATP

10. אדם אכל המשק זמו ממושך פטריה המכילה רעלן, שהינו חומר כימי פשוט. אנילזה מיקרוסקופית של תאי הכבד שלו הראתה הגדלה משמעותית בשטח הפנים של אחד מהאברונים המצוינים בתשובות א' עד ד'. ציין מיהו לדעתך האbron הסביר ביותר שטוח פניו?

א. Smooth ER

ב. Trans-Golgi

ג. Endosome

ד. Lysosome

**11.** חלבון המעטפת הנגיפית של נגיף שפעת החזירים, hemagglutinin (HA), הינו חלבון מمبرני אינטגרלי החוצה פעם אחת את המembrנה. בעקבות הדבקת חד-שכבה של תא אפייטל מהמעי בנגיף נמצא שהחלבון HA ממוקם אך ורק בembrana הפולסמה האפיקלית (apical plasma membrane) של התאים. אייזה מבנה תא מונע את מעבר החלבון באמצעות דיפוזיה במישור, ממembrנת הפולסמה האפיקלית לembrana הפולסמה הבזולטרלית (basolateral plasma membrane) ?

**א.** Tight-junctions

**ב.** Gap-junctions

**ג.** אינטראקציות עם החלבון G-actin

**ד.** Desmosomes

**12.** מי מסוגי תנועת הfosfolipids המצויינים תשפיו באופן המשמעותי ביותר על שמיירת המבנה הלא-סימטרי (asymmetric) לרוחב הדו-שכבה הfosfolipidית שלembranoות ביולוגיות?

**א.** Flip-flop

**ב.** Rotation

**ג.** Flexation

**ד.** Lateral diffusion

**חלק ב' – ביולוגיה של האורגניזם**  
**פרופ' אדוארדו מיטרני**

- عليك לענות על **12 מתוך 15** שאלות.
- חלק זה מהווים 40% מצינו הבדיקה
- לכל שאלה תשובה **אחד** נכון נכונה ביותר. אני הקיפו אך ורק אותה **ובעט לבוד**. לכל השאלות ניקוד זהה.

**1. השلد החוץ תא (ECM) בבעל חיים -**

- א. מורכב מתאית.
- ב. מגביל את נפח התא בהיותו קשיח.
- ג. עוזר בהכוונת הנדידה של תאים במהלך התפתחות העוברית.
- ד. משמש כמחסום לפטריות גורמות מחלות.
- ה. מורכב מכיטין.

**2. התמיינות נגרמת על ידי:**

- א. איבוד DNA.
- ב. ייצור צורה.
- ג. ביטוי דיפרנציאלי של גנים.
- ד. דטרמינציה.
- ה. כל התשובות נכונות.

**3. מניסויים שבהם עושים השטילות של רקמת חיבור (stroma) ורकמת אפיתל ממוקומות שונים ובשילובים התפתחותיים שונים בעובר העוף עולה המסקנה הבאה:**

- א. לא ניתן לשנות את הייעוד של תא אפיתל.
- ב. ניתן לשנות את הייעוד של רקמת החיבור (stroma) כתלות ברקמת האפיתל שעימה היא באה בmagic.
- ג. ניתן לשנות את הייעוד של רקמת האפיתל כתלות ברקמת החיבור (stroma) שעימה היא באה בmagic.
- ד. כל שכבה מתפתחת בצורה אוטונומית.
- ה. אף אחת מהתשובות אינה נכונה.

**4. לאיזה מהפקטורים הבאים תפקיד בתהליכי הגסטרולציה?**

- א. גוסקויד (Goosecoid).
- ב. אקטיבין (activin).
- ג. Nerve growth factor - NGF.
- ד. לפקטורים בתשובות א-ב.
- ה. לפקטורים בתשובות א-ג.

**5. מהם האיברים העיקריים מהתאים האקטודרמליים שנוצרו בתהליך הגסטרולציה?**

א. המח, מערכת העצבים ובלוטות הזיהה.


ב. מערכת השلد והשרירים.

ג. השכבות הפנימיות של המעי ומערכת הנשימה.

ד. הכבד והלב לב.

ה. אף תשובה לא נכון.

**6. השלם את שם המבנים המתוארים בציור (כתב שם ליד כלHz).**



**7. ארגנו את התהליכיים הבאים לפי סדר כרונולוגי:**

(1) יצירת הצינור הניוראל.

(2) תנועה של היכפולים הניוראלים (neural folds).

(3) עיבוי הרקמה הניירואktודרמלית (neural ectoderm).

א. 3, 2, 1


ב. 3, 1, 2

ג. 2, 1, 3

ד. 1, 2, 3

ה. כל התשובות אינן מציננות את הסדר הcronologique הנכון של התהליכים.

8. השלם את שם של המבנים המתוארים בציור (כתב שם ליד כלHz).



9. מה הייתה(mskna mahnisoi shel shpi'man v'mengold?

- א. מהשלב הראשון העובר הוא אדם שלם.
- ב. ואן לונהוק צדק בהשערה.
- ג. השפה הדורסלית של הבלסטופור ניתנת לבידוד ותיצור עובר שלם.
- ד. העובר מתפתח על ידי סדרה של אינטראקציות אוינדווקציות התמייניות.
- ה. מקורו של הציור הנייראי הוא השפה הדורסלית של הבלסטופור.

10. מי מארגוני הבאים נוצר מהסומיטים?

- א. שריר.
- ב. מבנים ניראלים.
- ג. אפידרמים.
- ד. סחוס.

ה. תשובה א-ד נכונות.

11. לאיזו מסקנה הגיע ואן לונהוק?

- א. העובר הוא אדם שלם כבר בזרע.
- ב. מקורו של ההומונקולוס הוא בבייצית.
- ג. השפה הדורסלית של הבלסטופור ניתנת לבידוד ותיצור עובר שלם.
- ד. העובר מתפתח על ידי סדרה של אינטראקציות אוינדווקציות התמייניות.
- ה. מקורו של הציור הנייראי הוא השפה הדורסלית של הבלסטופור.

**12. מי מהמשפטים הבאים הוא משפט נכון?**

- א. אין עדויות למקרים בהם נוירונים עוברים רגנרציה בבעלי חוליות.
- ב. רקמת האפיתל של המעי מחדשת את עצמה ללא הרף.**
- ג. לינקים אין איברים היכולם לעبور רגנרציה.
- ד. תשובות א-ג נכונות.
- ה. תשובות ב ו-ג נכונות.

**13. הכרית לומדת Shir חדש כל שנה כתוצאה מה-**

- א. תחוליך פסיאולוגי בלבד.**
- ב. ייצור נוירונים חדשים.
- ג. ייצור חיבורים (סינפסות) חדשים רק בין נוירונים קיימים.
- ד. תשובות א-ג נכונות.
- ה. אף תשובה לא נכונה.

**14. איזה המשפטים שגוי? תא מסת התאים הפנימית (Inner cell mass):**

- א. הם בעלי יכולת טוטיפוטנטית.
- ב. בעלי יכולת דיפרנציאציה.
- ג. עוברים התמרה סרטנית כশמושתלים מתחת עור.
- ד. עוברים התמרה סרטנית כشمושתלים למסת תאים פנימית (Inner cell mass).**
- ה. מסוגלים להתמיין לנוירונים.

**15. הניסוי בו שובטה הכבשה "דווי" בא לענות על השאלה:**

- א. האם הגרעין של יונק מתמיין באופן בלתי הפיך?**
- ב. מהי ההשפעה של אנזים על התמיינות התאים?
- ג. מהי ההשפעה של המיטוכונדריה על קצב גידילת התאים?
- ד. מהי ההשפעה של הרחם על התמיינות תאים?
- ה. כל התשובות נכונות.

## חלק ג' - ביולוגיה של תא הצמח

**פרופ' רחל נחושתאי וד"ר רחל גריין**

- עלייך לענות על **5 מתוך 7** שאלות.
- חלק זה מהווה 10% מציון הבחינה
- לכל שאלה תשובה **אחד** נכון ונכונה ביותר. אני הקIFO לך ורק אתה **ובעט לבדך**. לכל השאלות ניקוד זהה.

1. מהו הגורם המגביל ביותר, ולכן חשיבותו מכרעת, בהתפתחות ובמהלך חיי הצמחים:

1.1. לצמחים אין יכולת לבצע תהליכי עיבוד אנרגיה בנסיבות הנוחות להם.

1.2. צמחים נעדרי יכולים תנוצה.

1.3. בצמחים אין מערכת יעילה להרחקת רעלים.

1.4. צמחים אינם מסוגלים לייצר אנריה בחושך.

2. תא הצמח דומה בתכונותיו, הרכבו ומבנהו לכל תא אוקריוטי אחר. יחד עם זאת לתאי הצמח מספר מאפיינים המייחדים אותם. אני סמננו את התשובה המאפיינית ביותר את הייחודיות של תא הצמח:

2.1. תא צמח מוקפים בפלסמלמה בעלת תכונות ייחודיות

2.2. למיטוכונדריות והרטיקולום האנדופלסטי בתא הצימי תכונות ייחודיות.

2.3. דופן התא, החללית והכלורופלסט – מייחדים את התא הצימי.

2.4. אין בתא צמח מערכת תוך-תאית לتنועת מקרו- מולקולות

ואברוננים: אקטין ומיזין.

3. התא הצימי והצמח כולם מוגדרים מייצנים ראשוניים בגל:

3.1. שהזוף הריאנונית והשנונית שלהם מכילה תאית וטוכרים בכמות גדולה.

3.2. לאחר שתכולת המים והמלחים גדולה מאד בחלוקת של התאים הצימיים.

3.3. לאחר וצמחים מייצרים זרעים שלהם תכולת עמיין גדולה.

3.4. שיש להם יכולת להפוך אנרגית אור לאנרגיה כימית.

4. שני השלבים המרכיבים את תהליך הפוטוסינטזה – שלב ה"אור" ושלב ה"חושך" תלויים זה בזה מושם:

4.1. שני השלביםמאפשרים לתא הצמחית ל��פוך במשך כל היממה.

4.2. שלב "חושך" משתמש בתוצריו של ה"אור" - ATP ו-NADPH.

4.3. שם מתרחשים בחלוקת שונים של הקלורופלסט.

4.4. שלב ה"חושך" מספק לשלב ה"אור" מרכיבים החשובים להתרחשותו.

5. בחרו את התשובה הנכונה ביותר בנושא מריסטמות קודקודיות:

5.1. הן כוללות תא גזע

5.2. בדרך כלל הן קטנות מאד

5.3. הן יוצרות גבעולים, עלים ושורשים

5.4. כל המשפטים נכונים.

6. מה יקרה לצמחי אורז או חיטה אם ירססו אותם ב--2,4-

dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)

בחרו את התשובה הנכונה ביותר בנושא.

6.1. הם גדלו באופן בלתי מבוקר, דבר שיגרום למותם

6.2. הם יפסיקו להתארך לכיוון האור

6.3. לא יקרה דבר, כיון ש-2,4-D מעורר אינאקטיבציה בצמחים אלה

6.4. הצמחים יתחלו לפרוח מוקדם.

7. איזה משפט מהබאים אינו נכון?

7.1. אם מוציאים את כל הזרעים מפרי של תות שדה, אז הוא יפסיק לגודול

7.2. אוקסינים מלאכוטיים יכולים לשמש כקוטלי עשבים

7.3. מוטנטים שאינם מייצרים אוקסין הם בדרך כלל מאד קטנים

7.4. אוקסין מעכב את התפתחותם של ניצנים חיקיים